

## CT lumbale wervelkolom na caudografie

Binnenkort komt u naar ZGT om afbeeldingen van het wervelkanaal (caudografie) te laten maken. De caudografie wordt gemaakt door een radioloog. Hij/zij wordt geholpen door een laborant. Bij dit onderzoek worden het ruggenmerg en de zenuwen die zich daar bevinden afgebeeld. Meestal wordt er na de caudografie een CT-scan van de rug gemaakt. Het onderzoek doet meestal weinig pijn.

### Melden (opname)

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen in het ziekenhuis. De afdeling opnameplanning neemt telefonisch contact met u op, om de datum en het tijdstip van de opname aan u door te geven.

Op het met u afgesproken tijdstip kunt u zich melden bij de receptie van het ziekenhuis in de centrale hal.

### Verhinderend

Wanneer u door omstandigheden niet kunt komen, neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons op: Telefoonnummer 088 708 37 00.

### Belangrijk om te weten

#### Zwangerschap

Bent u zwanger of denkt u dat te zijn? Wilt u dit dan **vóór** het onderzoek melden? Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind.

#### Allergieën

Heeft u last van:

- Astma;
- Hooikoorts;
- Bronchitis.

Bent u overgevoelig voor:

- Medicijnen;
- Jodiumhoudende contrastvloeistof;
- Andere stoffen.

Graag melden **vóór** het onderzoek. Uw behandelend medisch specialist heeft daar al met u over gesproken.

Als u rookt, raden wij u aan om in ieder geval de uren voor de operatie niet te roken. Luchtwegen van rokers zijn gevoeliger voor ontstekingen.

### Vorbereiding

Het is belangrijk dat u de laatste twee uur voor het onderzoek niet meer eet, drinkt of rookt. Alleen dan lukt het onderzoek.

### Medicijnen

Onderstaand medicijngebruik moet u opvolgen!

(behalve als uw behandelend medisch specialist anders voorgeschreven heeft)

- Diuretica (plastabletten) niet innemen op de dag van het onderzoek.
- Apixaban(Eliquis), abigatran(Pradaxa), Edoxaban(Lixiana), Rivaroxaban(Xarelto): 2 dagen voor de dag van het onderzoek niet innemen.
- Sintrom of Acenocoumarol: 3 dagen voor de dag van het onderzoek niet innemen.
- Marcoumar, Fenprocoumon, Ascal, Persantin, Plavix, Clopidogrel : 7 dagen voor de dag van het onderzoek niet innemen.

Alle andere voorgeschreven medicijnen moet u blijven innemen.

### Hoe het onderzoek gaat

De laborant vraagt u op uw linkerzij op de onderzoekstafel te gaan liggen.

De huid op uw rug wordt ontsmet met chloorhexidine. Daarna brengt de radioloog een dunne naald in, in het wervelkanaal. Als de naald op de goede plaats zit, wordt een

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT\_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

kleine hoeveelheid ruggenmergvocht (liquor) afgenomen. De onderzoekstafel wordt met het hoofdeinde iets hoger gezet; de radioloog spuit contrastvloeistof in, wat een koud gevoel kan geven in de rug.

De contrastvloeistof zorgt ervoor dat het wervelkanaal zichtbaar wordt op een röntgenfoto. Na het inspuiten van de contrastvloeistof verwijderd de radioloog de naald. Hierna worden er röntgenfoto's gemaakt.

Aansluitend wordt u met een bed naar de CT-scanner gebracht en wordt de CT-scan van uw rug en wervelkanaal gemaakt.

Het CT-apparaat ziet eruit als een grote ring, de onderzoekstafel schuift door deze ring. U komt op deze verschuifbare onderzoekstafel te liggen. De laborant vertelt u hoe u moet gaan liggen. De tafel schuift vaker heen en weer in de open ring. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stilligt. De scan duurt ongeveer 5 minuten.

### **Naar de verpleegafdeling**

Na het onderzoek (De caudografie en de CT-scan) wordt u in bed teruggebracht naar de afdeling.

U heeft 2 uur bedrust. Het hoofdeinde van het bed staat omhoog, zodat de contrastvloeistof niet naar het hoofd kan lopen.

Als u zich goed voelt mag u na 2 uur het bed uit en kunt u naar huis gaan.

Een klein aantal patiënten krijgt na het onderzoek last van hoofdpijn en misselijkheid. Mocht dit bij u het geval zijn, dan raden wij u aan op bed te gaan liggen met een verhoging onder het hoofdeinde van uw bed. U moet veel drinken. Tegen hoofdpijn mag u paracetamol innemen.

### **Vervoer**

Wij adviseren u vervoer naar huis te regelen. U kunt na het onderzoek niet fietsen of autorijden.

### **Nazorg thuis**

Wilt u bij een van onderstaande klachten direct contact opnemen?

- Koorts (38,5°C en hoger);
- Nabloeding;
- Zwelling;
- Aanhoudende pijn.

Dit kan maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur met de afdeling radiologie, telefoonnummer 088 708 37 00.

Heeft u een van bovenstaande klachten of andere klachten en/of vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, dan belt u buiten kantooruren met de spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 708 78 78.

### **Uitslag van het onderzoek**

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend medisch specialist.

### **Medische apparatuur (zoals een insulinepomp)**

Gebruikt u een medisch apparaat zoals een insulinepomp of (externe) neurostimulator? Er bestaat een kleine kans dat de werking van het apparaat verstoord raakt door blootstelling aan röntgenstraling. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat om te zien hoe u hiermee om moet gaan.

### **Vragen**

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze graag voor u beantwoorden.

Op werkdagen is de afdeling radiologie tussen 08.30 – 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088 708 37 00.

### **Bekijk uw gegevens op MijnZGT**

MijnZGT is de patiëntenwebsite van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien. Ook kunt u daar persoonlijke gegevens bekijken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt).