

## Oorcorrectie

Het afstaan van oorschelpen, ook wel flaporen genoemd, is een aangeboren afwijking. De afstand van de rand van de oorschelp tot het hoofd is dan te groot. Dit kan enkelzijdig en dubbelzijdig voorkomen. Soms gaat het alleen om de bovenzijde van het oor. Een flapoor kenmerkt zich door het ontbreken van de normale plooi in het kraakbeen. Dit is operatief te corrigeren.

### De operatie

De ingreep vindt meestal onder narcose plaats, maar kan bij volwassenen of oudere kinderen ook goed onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. In het geval van algehele anesthesie gebeurt het in een dagbehandeling. Bij plaatselijke verdoving volstaat een poliklinische behandeling. Aan de achterzijde van de oorschelp wordt een huidsnede gemaakt. De insnijding zorgt ervoor dat de spanning van het kraakbeen verminderd. Hierdoor blijven de oren dicht bij het hoofd staan.

Door de operatie komt er een litteken achter het oor. Wij gebruiken doorgaans oplosbare hechtingen die vanzelf verdwijnen. De oren worden in de nieuwe stand gefixeerd door een zogenaamd tulbandverband dat we rondom het hoofd aanbrengen.

### Na de operatie

Meestal blijft het verband een week zitten. Na een week wordt het verband op de polikliniek verwijderd. De afspraak hiervoor krijgt u mee. De oren zijn na een week nog wat gezwollen en soms blauw verkleurd. Soms schuift het tulbandverband van het hoofd af. Dan kunt u het verband verwijderen en een sportband of haarband om doen. Na verwijdering van het verband draagt u nog twee weken dag en nacht de band ter bescherming van uw oren en daarna nog twee weken 's nachts. Ook overdag is het belangrijk voorzichtig te zijn met uw oren, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

### Resultaat

Een oorcorrectie kan al worden uitgevoerd vanaf zes jaar. Het resultaat van een operatie is over het algemeen goed. Het is echter belangrijk niet té hoog gespannen verwachtingen te hebben. Kraakbeen is een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht blijven staan, kan daarom nooit voor honderd procent worden gegarandeerd. Een absolute symmetrie van de stand van de oren is dus vrijwel onmogelijk.

De zwelling verdwijnt in enkele weken en na ongeveer drie maanden kan van een eindresultaat worden gesproken. De meeste patiënten hebben weinig last van de operatie en van de periode daarna. Gedurende de eerste winterperiode na de operatie kan kou als pijnlijk worden ervaren. Na een jaar komen deze klachten meestal niet meer voor.

### Risico's en complicaties

Het rechtzetten van flaporen heeft verder dezelfde risico's als elke andere operatie. De wond kan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Dit verdwijnt geleidelijk. Bij extreme pijn en nabloeding neemt u direct contact op met uw plastisch chirurg.

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [facebook.com/ZGTInfo](https://facebook.com/ZGTInfo)

 [twitter.com/ZGT\\_info](https://twitter.com/ZGT_info)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [youtube.com/user/ZGTInfo](https://youtube.com/user/ZGTInfo)

 [zgt.nl](https://zgt.nl) - [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt)

## Contact

Bij vragen of problemen kunt u tijdens kantooruren (8.00 tot 16.30 uur) contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie via telefoonnummer:

**088 708 52 45**

Bij complicaties buiten kantooruren kunt u bellen met ZGT (**088 708 78 78**) en u laten doorverbinden met de spoedeisende eerste hulp.