

## Het verloop van de Velcade/Cyclofosfamide/Dexamethason (VCD) kuur

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit drie medicijnen:

1. **V**elcade (=bortezomib)
2. **C**yclofosfamide
3. **D**examethason

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
V C D	D		V D	D			V C D	D		V D	D										

### Wijze van toediening:

Velcade is een onderhuidse injectie. De cyclofosfamide wordt u toegediend via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling oncologie van ZGT. Dexamethason is in tabletvorm en neemt u thuis volgens voorschrift in.

De totale toediening duurt ongeveer een kwartier tot half uur. De kuur wordt afhankelijk van de bloedsuitslagen om de drie weken gegeven. Het kan zijn dat u tussendoor extra bloed moet laten prikken.

### Overige medicatie:

U krijgt één keer per drie maanden zoledroninezuur via het infuus. Deze toediening duurt ongeveer een half uur. Indien dit kan worden gecombineerd met de kuur dan duurt de totale toediening ongeveer een half uur langer.

### Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende specifieke bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5 moet u contact met ons opnemen.
- Cyclofosfamide kan klachten geven die lijken op een blaasontsteking. Het is daarom van belang dat u gedurende de eerste dagen na de toediening veel drinkt (anderhalf tot twee liter per dag).
- Dexamethason kan de opname van suiker in uw lichaam verstoren. Door dexamethason kan uw uiterlijk tijdelijk veranderen, bijvoorbeeld een blozend gezicht. Tevens kunt u een opgejaagd gevoel krijgen en uw stemming kan wisselen.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen en/of vingertoppen. Dit graag melden bij een volgend bezoek aan uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of bij de oncologieverpleegkundige. In de bijgeleverde

#### Almelo

Zilvermeeuw 1  
Postbus 7600  
7600 SZ Almelo

#### Hengelo

Geerdinksweg 141  
Postbus 546  
7550 AM Hengelo

 [zgt.nl/mijnzgt](http://zgt.nl/mijnzgt)

 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjBP>

 [facebook.com/zgtinfo](https://facebook.com/zgtinfo)

 [linkedin.com/company/zgt](https://linkedin.com/company/zgt)

 [twitter.com/zgt\\_info](https://twitter.com/zgt_info)

 [youtube.com/user/zgtinfo](https://youtube.com/user/zgtinfo)

folder van de velcade staat een 'vragenlijst voor perifere neuropathie' ter inventarisatie van deze klachten. Wij vragen u deze lijst te hanteren bij het inventariseren van uw klachten.

- De injectie kan plaatselijk een rode verkleuring van de huid geven. Injectieplaatsen dienen geroteerd te worden. U krijgt een schema mee waarop de verpleegkundige iedere injectieplaats noteert.
- Uw haar gaat in principe niet uitvallen, mogelijk wordt het alleen wat dunner. Dit is van tijdelijke aard. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid.
- Resten velcade en cyclofosfamide blijven 72 uur na elke gift in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma, speeksel en braaksel) aanwezig. In het ziekenhuis krijgt u adviezen over hoe u hiermee om kunt gaan.
- De bijwerkingen die kunnen optreden bij zoledroninezuur zijn een griepachtig beeld, hoofdpijn en maag-darmstoornissen. Zorg ervoor dat u tijdens en na het infuus extra drinkt om de kans op klachten en bijwerkingen te verminderen. Zo nodig mag u vier keer daags 1000mg paracetamol gebruiken.

**In de bijgeleverde folder van de Velcade leest u overige specifieke informatie betreffende de behandeling.**

Indien u klachten krijgt die u niet vertrouwt mag u altijd contact met ons opnemen.

### **Check uw dossier op MijnZGT**

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: [zgt.nl/mijnzgt](https://zgt.nl/mijnzgt).