

WALANT verdoving tijdens uw poliklinische ingreep

Binnenkort komt u naar ZGT voor een poliklinische ingreep onder WALANT verdoving. In deze folder staat wat u kunt verwachten.

Wat is "WALANT"?

WALANT staat voor Wide Awake Local Anaesthetic No Tourniquet. "WALANT" is een plaatselijke verdoving. Het voordeel van deze plaatselijke verdoving is dat mogelijke pijnklachten worden voorkomen. Hierdoor kunnen sommige operaties poliklinisch worden uitgevoerd en hoeft u niet meer opgenomen te worden in het ziekenhuis. Ook werkt het verdovingsmiddel langer, zodat u ook na de operatie minder pijn heeft.

Overleg met de behandelend medisch specialist

- wanneer u allergisch bent voor bepaalde medicijnen
- wanneer u bekend bent met een vaatziekte.

U hoeft zich niet voor te bereiden

U mag thuis gewoon eten en drinken. Tenzij anders met u is afgesproken, hoeft u vooraf niet te stoppen met bloedverdunders of andere medicijnen.

Zo gaat de behandeling

- De behandeling is op het behandelcentrum.
- Als u aan de beurt bent, wordt u naar de behandelkamer gebracht.
- De medisch behandelend specialist zal de plaats waar geopereerd gaat worden verdoven.
- Deze prikken zijn vergelijkbaar met een verdoving zoals bij de tandarts en kunnen even pijnlijk zijn.
- De verdoving heeft ongeveer drie kwartier nodig om in te werken.

- U mag daarom na de verdoving weer in de wachtkamer gaan zitten.
- Als de verdoving goed is ingewerkt, wordt u weer opgehaald voor de ingreep zelf.
- U mag nu geen pijn meer voelen, maar u merkt wel dat de behandelend medisch specialist u aan het opereren is.
- U mag na de behandeling niet zelf autorijden. Daarom is het van belang dat u vooraf vervoer naar huis regelt.

Na de ingreep

- U hoort wat u thuis wel en niet mag doen.
- Als de wond gaat bloeden, kunt u het beste met een schone doek 10 minuten op de wond drukken.
- Indien de bloeding aanhoudt moet u contact opnemen met het ziekenhuis.
- De assistente maakt een afspraak voor u voor de controle.
- De verdoving kan een half uur tot één uur werken, soms kan de verdoving ook tot de volgende dag werken.
- Het is mogelijk dat u last krijgt van napijn, u kunt dan als pijnstiller paracetamol innemen.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Heeft u vragen?

Op de dag van de ingreep kunt u uw vragen stellen aan de behandelend medisch specialist of aan een verpleegkundige.

Heeft u thuis vragen of problemen, neem dan contact op met het ziekenhuis:

- Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het secretariaat van heelkunde, telefoonnummer 088 708 52 33.
- Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 708 78 78.

Tip: bekijk uw dossier op MijnZGT

Dit is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt hier uw medisch dossier bekijken en bijvoorbeeld vragenlijsten invullen. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.