

Het verloop van de TRAP 2 kuur, studiebehandeling Paclitaxel/Carboplatin/Trastuzumab/Pertuzumab/Radiotherapie

U begint met een chemokuur. Deze kuur bestaat uit vier medicijnen en radiotherapie.

1. **P**ertuzumab
2. **H**erceptin (=Trastuzumab)
3. **P**aclitaxel
4. **C**arboplatin
5. **R**adio**T**herapie

Week 1 Dag 1	Week 2 Dag 8	Week 3 Dag 15	Week 4 Dag 22	Week 5 Dag 29	Week 6 Dag 36	Week 7 Dag 43	Wk 10 Dag 64	Wk 13 Dag 85
Ptz			Ptz			Ptz	Ptz	Ptz
H	H	H	H	H	H	H	H	H
p	p	p	p	p				
C	C	C	C	C				
RT(5 dgn)	RT(5 dgn)	RT(5 dgn)	RT(5 dgn)	RT(3 dgn)				

Manier van toedienen:

U krijgt de medicijnen via een infuus in een ader in uw hand of arm. Deze behandeling gebeurt op de dagbehandeling oncologie van ZGT. Om een allergische reactie op paclitaxel te voorkomen krijgt u vooraf medicijnen. Het is belangrijk dat u eventuele klachten tijdens de toediening direct meldt aan de oncologieverpleegkundige. De eerste kuur duurt een hele dag. Vanaf kuur twee is dit ongeveer een halve dag.

U krijgt, afhankelijk van de bloedsuitslagen, de eerste zeven weken één keer per week deze kuur. Daarna wordt de kuur om de drie weken gegeven tot en met week 13.

Na de chemokuur in week 1 tot en met 4, krijgt u op maandag tot en met vrijdag de radiotherapie. In week 5 is dat op maandag tot en met woensdag. In totaal krijgt u 23 keer radiotherapie.

Naast de algemene bijwerkingen kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

- Bij koorts boven de 38,5° moet u contact met ons opnemen.
- U kunt een griepachtig gevoel, spierpijn en pijnlijke gewrichten krijgen die over het algemeen een aantal dagen aanhouden. U mag zonodig maximaal vier keer daags 1000 mg paracetamol innemen.
- Uw haar gaat uitvallen. Dit is tijdelijk. Haaruitval begint meestal met een pijnlijke hoofdhuid. Een machtiging voor een eventueel haarwerk kunt u vragen aan de oncologieverpleegkundige.
- U kunt last krijgen van tintelingen en/of een doof gevoel in tenen, voetzolen en in de vingertoppen. Dit graag even melden bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis.
- Resten cytostatica kunnen tot dag vijf in het lichaamsvocht (onder meer urine, ontlasting, sperma en braaksel) aanwezig zijn. In het ziekenhuis krijgt u adviezen hoe u hiermee om kunt gaan.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 zgt.nl/mijnzgt

 zorgkaart <http://bit.ly/1y7WjbP>

 facebook.com/zgtinfo

 linkedin.com/company/zgt

 twitter.com/zgt_info

 youtube.com/user/zgtinfo

De bijwerkingen die kunnen optreden bij Trastuzumab en Pertuzumab vindt u terug in het bijgevoegde informatieboekje en in de patiënten informatie van de TRAP 2 studie.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.