

Azathioprine (Imuran)

Uw longarts heeft azathioprine voorgeschreven voor de behandeling van uw longziekte. Om dit medicijn goed te gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter van de apotheek.

Het effect van azathioprine

Azathioprine is een medicijn dat de afweerreactie van het lichaam onderdrukt. Daardoor worden ontstekingen geremd. Azathioprine wordt onder andere gebruikt bij de behandeling van interstitiële longziekten. Dit zijn aandoeningen die te maken hebben met de ruimte tussen de longblaasjes en de bloedvaten, zoals bijvoorbeeld sarcoïdose en chronische extrinsieke allergische alveolitis (EAA). Azathioprine wordt ook veel gebruikt bij reumapatiënten.

Azathioprine kan de oorzaak van uw longziekte niet wegnemen. Wel kan het uw ziekte remmen. Hierdoor kunnen klachten als kortademigheid en hoesten na enige tijd afnemen. Het kan twee tot vier maanden duren voordat u merkt dat azathioprine begint te werken. Een nadeel is dat uw afweersysteem geremd wordt waardoor u vatbaarder bent voor infecties.

Vorbereiding

Bloedcontrole voor gebruik

Voorafgaand aan de start van de behandeling wordt er vanuit het bloed naar het TPMT-gen (DNA) gekeken. Wanneer er een afwijkend gen gevonden wordt kan er gekozen worden voor een lagere dosering of wordt de dosering langzamer opgebouwd om bijwerkingen te voorkomen.

Informeer uw medisch specialist als u medicijnen tegen jicht gebruikt

Als u naast azathioprine tevens middelen gebruikt tegen jicht (allopurinol) vertel dit dan aan uw behandelend medisch specialist. De dosis azathioprine moet dan verminderd worden wegens grotere kans op bijwerkingen.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Neem tijdig contact op (minimaal drie maanden voordat u zwanger wilt worden) met uw longarts of verpleegkundig specialist om te overleggen of azathioprine invloed heeft op de vruchtbaarheid (dit geldt ook voor mannen), het ongeboren kind, de zwangerschap zelf en borstvoeding. Indien u zwanger geraakt bent onder het gebruik van azathioprine neem dan contact op met uw longarts of huisarts.

Behandeling

Wijze van innemen

Azathioprine is een medicijn in de vorm van tabletten van 25 en 50 milligram. De longarts bepaalt voor u de dosering. De eerste week wordt meestal één tablet azathioprine van 50 milligram per dag voorgeschreven. Daarna wordt de dosering verhoogd naar twee of drie tabletten van 50 milligram per dag. Neem de tabletten in zijn geheel in met water en bij voorkeur na de maaltijd. Door de tabletten na het eten in te nemen, heeft u minder last van maagdarmklachten zoals verminderde

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

eetlust, misselijkheid en braken. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt. Als u de tabletten vergeten hebt in te nemen, neem deze dan op een later tijdstip nog dezelfde dag in.

Bloedcontroles tijdens gebruik

Azathioprine onderdrukt het beenmerg waar de voorlopers van nieuwe bloedcellen worden gemaakt. Met name bij een hoge dosering kan er een tekort aan bepaalde bloedcellen ontstaan. Het gevolg kan dan bloedarmoede zijn, meer kans op bloedingen en een verminderde afweer. Dit kan al na enkele weken ontstaan. Het bloed wordt daarom regelmatig gecontroleerd. Mochten er bij deze controles afwijkingen worden geconstateerd, dan wordt tijdelijk gestopt met het gebruik van azathioprine of wordt de dosis verlaagd. Door regelmatig het bloed te laten controleren, kan een aantal bijwerkingen (leverfunctiestoornissen, afwijkende aanmaak bloedcellen) vroegtijdig worden opgespoord. Houdt u zich daarom goed aan de afspraken voor bloedcontroles.

Bijwerkingen

Bij het gebruik van azathioprine kunnen soms bijwerkingen voorkomen, die meestal weer overgaan na het tijdelijk stoppen met de medicatie of het verlagen van de dosis. Soms is het noodzakelijk het middel definitief te staken.

Mogelijke bijwerkingen zijn:

- Verhoogde kans op infectie: azathioprine onderdrukt het natuurlijke immuun stelsel en hiermee de afweer.
- Koorts, door overgevoeligheid voor azathioprine of ten gevolge van infecties.

- Leverfunctiestoornissen: dit kan samen gaan met misselijkheid, minder eetlust en koorts.
- Maag- en darmklachten zoals een verminderde eetlust, een vol gevoel, misselijkheid, braken of diarree.
- Overgevoeligheidsreacties zoals (jeukende) huiduitslag, koorts, koude rillingen, spierpijn.
- Erge keelpijn met koorts, regelmatig een bloedneus en snel blauwe plekken (tekenen van stoornis in bloedaanmaak).

Waarschuwingen

- Neem contact op met uw longarts of huisarts bij koorts, koude rillingen, ernstige infectie, ernstig ziek zijn en bijwerkingen (met name huiduitslag, heftige keelpijn met koorts, bloedneuzen en snel blauwe plekken, gele verkleuring van het oogwit, gevoelige en opgezwollen buik).
- Als u veel last hebt van misselijkheid en braken, neem de tabletten dan in vóór het slapen gaan. Meestal hebt u dan minder last hiervan.
- Wees voorzichtig met alcohol vanwege een verhoogde kans op leverfunctiestoornissen. Neem daarom niet meer dan één alcoholconsumptie per dag.
- Beperk blootstelling aan Uv-licht (zon) door het dragen van beschermende kleding en het gebruik maken van een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 20-30).

Overige aandachtspunten

Tandheelkundige ingrepen

Azathioprine mag u in de periode voor, tijdens en na een tandheelkundige ingreep blijven innemen. Informeer tijdig degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met azathioprine.

Geplande operaties

Azathioprine kunt u meestal in de periode voor, tijdens en na een geplande operatie blijven innemen. Bij grote operaties of als u erg ziek bent kan uw longarts of diegene die de operatie uitvoert alsnog voor de zekerheid besluiten om azathioprine tijdelijk te staken. Het is verstandig om uw longarts tijdig te informeren dat u een operatie moet ondergaan. Informeer tijdig degene die de operatie uitvoert dat u wordt behandeld met azathioprine.

Reizen en vaccinaties (inenting)

Laat u niet vaccineren met een levend vaccin zoals de BMR, BCG en gele koorts. De griepvaccinatie en coronavaccinatie mogen wel en worden zelfs aanbevolen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met uw longarts of verpleegkundig specialist of bezoek onze website.

- Telefoonnummer polikliniek longziekten:
088 708 33 00.
- Website afdeling longziekten:
zgt.nl/longgeneeskunde.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

Disclaimer

Deze patiëntfolder is een verkorte versie van de officiële bijsluiter en vervangt deze niet.

Vragen