

Bronchoscopie met Broncho Alveolaire Lavage (BAL)

Bij een bronchoscopie wordt in de luchtwegen gekeken met behulp van een bronchoscoop. Dit is een flexibel slangetje met een sterke lichtbron en speciale lenzen. De bronchoscoop maakt het voor de longarts mogelijk om uw luchtwegen direct te bekijken. De longarts krijgt zo een goed beeld van de structuur van het slijmvlies, de aanwezigheid van ontstekingen en eventuele afwijkingen. Ook kan slijm of een stukje slijmvlies worden weggenomen voor verder onderzoek.

Vorbereiding

Houd rekening met de volgende zaken:

- Vanaf 24.00 uur de avond vóór het onderzoek mag u niet eten en drinken.
- Draag comfortabele, niet knellende, kleding.
- Bij opname krijgt u een infuusnaald ingebracht. Dit is vanwege het eventueel toedienen van medicatie (roesje).
- Het is verstandig het vervoer naar huis van tevoren te regelen. In verband met eventuele medicatie **mag u niet zelf rijden.**

Belangrijk!

- Vertel uw behandelend medisch specialist van tevoren of u geneesmiddelen gebruikt of allergisch bent voor geneesmiddelen en/of verdooving.
- Indien u Sintrom of andere bloedverdunners gebruikt dient u dit in overleg met uw behandelend medisch specialist dagen voor het onderzoek te stoppen.
- Heeft u diabetes en gebruikt u insuline, dan mag u de ochtend van het onderzoek geen insuline spuiten. Neem de insulinepen wel mee naar het ziekenhuis.
- Overige medicijnen dient u met zo weinig mogelijk water in te nemen.

Uw afspraak

U heeft een afspraak in:

Hengelo op om uur
U meldt zich 30 minuten voor uw afspraak bij de centrale receptie van het ziekenhuis bij de hoofdingang. Een gastvrouw begeleidt u dan naar de poli 0.4/dagverpleging.

Almelo op om uur.
U meldt zich 30 minuten voor uw afspraak bij de receptie van het behandelcentrum (route 1.4).

Is er sprake van een spoedgeval, dan bestaat de mogelijkheid dat uw onderzoek verschoven wordt naar een andere dag.

Voor het onderzoek

U wordt voor het onderzoek opgenomen op de poli 0.4 in Hengelo of poli 1.4 in Almelo. Hier wordt u ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige bespreekt met u en uw (eventuele) begeleider het tijdstip waarop u naar huis mag. Vervolgens vindt de controle van uw zuurstof in het bloed, pols en bloeddruk plaats. Dit gebeurt voordat u naar de onderzoekskamer wordt gebracht.

Het onderzoek

De medisch specialist en een verpleegkundige zijn tijdens het onderzoek bij u en zij leggen u precies uit wat er gaat gebeuren. Wanneer u een kunstgebit draagt, moet u deze uitdoen. Voordat het onderzoek plaatsvindt wordt u diep in de mond met een spray plaatselijk verdoofd en in de keel met een vloeistof. Als

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

er met u is afgesproken dat u een roesje krijgt, dan wordt er ook een infuus aangelegd. Via het infuus krijgt u een middel waardoor u slaperig wordt en minder merkt van het onderzoek.

Hierna brengt de medisch specialist de bronchoscoop in via uw mond. Deze gaat langs de stembanden en komt uit in de luchtpijp en de grote luchtwegen.

Tijdens het onderzoek is het mogelijk dat op pijnloze wijze een stukje weefsel wordt verwijderd en/of slijm wordt weggezogen. Ook wordt er vloeistof in uw luchtwegen gespoten en weer weggezogen (broncho alveolaire lavage).

Tijdens het onderzoek kunt u rustig doorademen. Indien nodig kan er extra zuurstof worden toegediend.

Na het onderzoek

Na het onderzoek komt u weer terug op de patiëntenkamer. U mag na het onderzoek een uur niet eten en drinken. Door de verdoving is het namelijk mogelijk dat u zich verslikt.

Zodra de verdoving van de keel is uitgewerkt mag u enkele slokjes water drinken om te zien of u weer kunt slikken. Gaat dit goed dan mag u na het eten en drinken weer naar huis.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 15-30 minuten. U bent echter inclusief de voorbereiding en eventuele nazorg tot maximaal drie uur in het ziekenhuis.

Bijzonderheden

Complicaties komen zelden voor. Wat bloederig slijm ophoesten is gebruikelijk, ook kunt u kortdurend wat koorts krijgen.

Als u na het onderzoek

- in toenemende mate bloederig slijm ophoest,

- pijn heeft bij het ademen,
- benauwd wordt,
- koorts krijgt, of als de koorts aanhoudt,

Neemt u dan telefonisch contact op met de polikliniek longgeneeskunde. Telefoonnummer 088 708 33 00.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer 088 708 78 78.

De uitslag

Zodra uw behandelend specialist de uitslag van het onderzoek heeft ontvangen zal hij deze met u bespreken. U krijgt daar ongeveer een week na het onderzoek een afspraak voor.

Soms kan de medisch specialist die het onderzoek heeft verricht u alvast een voorlopige uitslag geven. Als er echter weefselstukjes of een kweek zijn genomen, duurt het een aantal dagen voordat die uitslag bekend is. Het kan ook zijn dat verder onderzoek of behandeling nodig is. De medisch specialist zal dit met u bespreken.

Wanneer u in het ziekenhuis ligt, hoort u de uitslag tijdens de opname van de longarts/arts-assistent.

Time-out procedure

Wij werken volgens landelijke kwaliteitseisen met de zogenaamde Time-out procedure. Dit betekent dat we vóór elk onderzoek op verschillende momenten dezelfde vragen stellen, bijvoorbeeld 'wat is uw geboortedatum?' Dit doen we om uw veiligheid te waarborgen.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. Uw medisch specialist of verpleegkundige wil ze graag beantwoorden.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.