

Vroege infectie herkennen bij uw baby

Uw baby is opgenomen ter observatie omdat hij/zij een verhoogde kans heeft op het krijgen van een infectie. Dit kan zijn omdat er risicofactoren zijn bij uw baby (te vroeg geboren zijn, koorts, andere symptomen) of bij moeder (eerdere baby met groep B-streptokokken (GBS-ziekte) na de geboorte, ernstige infectie of koorts bij moeder tijdens de bevalling). De kans dat uw baby na de opname in het ziekenhuis nog ziek wordt, is aanwezig. Daarom wordt in deze folder uitgelegd waar u op moet letten en wanneer u uw verloskundige of huisarts moet waarschuwen.

Infectie

Wanneer een pasgeboren baby binnen drie dagen na de geboorte door een infectie ziek wordt, noemen wij dit vroege vorm van een infectie bij een pasgeboren baby. Deze infectie kan mild verlopen maar ook ernstig. Een bacterie die voor deze vroege infecties bij pasgeboren baby's kan zorgen, is de groep B-streptokokken. GBS komt voor bij één op de vijf zwangere vrouwen, zonder dat zij hiervan klachten hebben. Deze vrouwen, ook wel draagster genoemd, dragen deze bacteriën dan bij zich in de vagina (schede). Dat kan meestal geen kwaad, maar een klein aantal baby's wordt ziek. Naast GBS kunnen ook andere bacteriën leiden tot deze vroege vorm van een infectie bij baby's..

Waar moet u op letten bij uw baby?

Een baby kan langzaam of soms heel snel ziek worden. Als zij ziek zijn, kunnen zij:

- Een grauwe kleur hebben;
- Een ander gedrag laten zien. Bijvoorbeeld ontroostbaar huilen of lusteloosheid);
- Slecht drinken;
- Een te lage (lager dan 36°C) of te hoge (hoger dan 38°C) lichaamstemperatuur hebben;
- Snel of kreunend ademen waarbij de neusvleugels bewegen.

Deze klachten worden bij een baby gezien als alarmsignalen. Het is dan noodzakelijk om snel met uw verloskundige of huisarts te bellen, die u zo nodig doorverwijst naar het ziekenhuis.

Er is niet altijd sprake van een (ernstige) infectie. Echter, als de kinderarts vermoedt dat uw baby een infectie heeft, wordt hij/zij opgenomen. Er wordt dan nader onderzoek gedaan en behandeling met antibiotica via een infuus gestart. Dit onderzoek bestaat uit onder andere een bloedkweek en bloedonderzoek. Het kan ook nodig zijn om een ruggenprik te verrichten.

Vragen

Heeft u vragen? Stel deze dan aan de behandelend specialist, verloskundige, verpleegkundige of huisarts. Wij vinden het belangrijk dat u goed begrijpt wat er aan de hand is.

Telefoonnummers

- U neemt altijd eerst contact op met uw huisarts of verloskundige
- De afdeling neonatologie: 088 708 44 51

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt